Nouveaux Coléoptères exotiques,

par M. M. Pic.

Les nouveautés décrites ci-après, faisant partie des collections du Muséum national de Paris, proviennent, soit des chasses de J. Harmand au Sikkim, en 1886, soit des récoltes faites, en 1876, à Moupin (Chine) par l'abbé R. David.

Toutefois les six dernières espèces figurent seulement dans ma collection.

Melandryidæ.

Osphia Harmandi nov. sp.

Valde angustata, nitida, testacea, antennis pro majore parte, capite postice, thorace medio, scutello, elytris tarsisque nigro-piceis, pectore pro parte et tibiis paulo brunnescentibus.

Très allongé, subparallèle, brillant, orné d'une pubescence grise assez dense, en partie un peu soulevée, avec le prothorax et les élytres modérément ponctués, en partie testacé, en partie noir de poix avec partie du dessous et des pattes seulement rembrunie. Antennes longues et grêles, foncées, largement testacées à la base; tête médiocre, testacée, marquée de foncé entre les yeux; prothorax à peu près aussi large que long, subarqué sur les côtés, un peu plus étroit que les élytres, foncé au milieu, testacé sur son pourtour; élytres foncés, longs, étroits et parallèles; dessous du corps et pattes bicolores. Long. : 8 millimètres.

Sikkim.

A placer près de *O. nigriventris* Chp.; s'en distingue, à première vue, par la coloration du dessus en partie foncée.

Cantharidæ (*Telephoridæ*).

Themus Mangini nov. sp.

Parum elongatus, subparallelus, nitidus, griseo-pubescens, rufo-testaceus, elytris cyaneo-metallicis, apice breve acuminatis.

Peu allongé, subparallèle, brillant, orné d'une pubescence grise avec des poils courts redressés sur les élytres, testacé roussâtre avec les élytres

bleus. Tête un peu plus étroite que le prothorax, finement et éparsément ponctuée ; antennes grêles; prothorax presque lisse, court et large, un peu rétréci en avant, subsinué sur les côtés, peu inégal en dessus avec un pli dans les angles postérieurs; élytres à peine plus larges que le prothorax, courts, un peu sinués sur les côtés, courtement acuminés au sommet, assez finement et irrégulièrement ponctués avec des traces de côtes; ailes et abdomen dépassant un peu le sommet des élytres. Long. : 11 millimètres.

Sikkim.

Espèce distincte, à première vue, par ses élytres courtement acuminés au sommet.

Ce m'est un devoir de dédier cette nouveauté à M. le professeur Mangin, directeur du Muséum, en remerciement de son bienveillant accueil.

Cantharis moupinensis nov. sp.

Elongata, subparallela, nitida, griseo pubescens et hirsuta, rufa, elytris cyaneis, metallicis, antennis nigris, ad basim rufis.

Allongé, subparallèle, brillant, orné d'une pubescence grise en partie soulevée, avant-corps peu ponctué, roux avec les élytres d'un bleu métallique, ceux-ci ruguleux. Tête pas très longue, de la largeur du prothorax; antennes grêles, noires à base rousse, 2e article pas très long, notablement plus court que le 3e; prothorax presque carré, subarqué en avant, presque droit sur les côtés, sillonné au milieu; élytres un peu plus larges que le prothorax, assez longs, un peu élargis derrière les épaules et rétrécis ensuite; pattes assez grêles, tibias droits, ongles simples ou un peu élargis à la base. Long. : 10 millimètres.

Moupin.

Peut se placer près de *C. Martini* Brg., plus allongé et autrement coloré.

Rhagonycha Harmandi nov. sp.

Elongata, nitida, griseo pubescens, sat longe hirsuta, nigra, antennis ad basim, capite, thorace, pedibus pygidioque rufo- testaceis.

Allongé, brillant, orné d'une pubescence grise avec des poils redressés assez longs sur les élytres, l'avant corps étant presque lisse, en partie noir, en partie testacé-roussâtre. Tête peu rétrécie en arrière avec les yeux, qui sont saillants, un peu plus large que le prothorax, roussâtre, côtés sous les yeux et base des mandibules flaves, mandibules très longues; antennes grêles et longues, noires avec les deux premiers articles et la base du 3e roux, 2e très court, 3e trois fois aussi long que lui; prothorax plus long que large, assez étroit, un peu rétréci en avant, subsinué sur les côtés,

un peu inégal en dessus, sillonné au milieu, roux-testacé; élytres noirs, peu plus larges que le prothorax, subparallèles, densément ponctués-ruguleux sauf sur la base qui est brillante avec des traces de côtes; pattes testacées, longues avec les cuisses un peu épaissies, les tibias intermédiaires et postérieurs un peu arqués, ongles supposés bifides; pygidium fortement entaillé et terminé en dessus par deux lobes appointés. Long. : 7 millimètres.

Sikkim.

N'ayant pas pu voir la structure des tarses, je place, provisoirement, cette espèce dans le genre *Rhagonycha* Esch., près de *formosana* Pic, elle est moins étroite, avec le prothorax plus court, les cuisses un peu épaissies et les antennes moins grêles que chez cette dernière espèce.

Podabrus flavus nov. sp [1].

Elongatus, nitidus, sparse griseo pubescens, flavus, antennis pro majore parte et infra corpore nigris, elytris in disco postice aliquot paulo infuscatis.

Allongé, brillant, éparsément pubescent, flave avec les articles 3 et suivants des antennes et le dessous du corps, sauf le sommet de l'abdomen, noirs; élytres parfois un peu obscurcis sur leur disque et postérieurement. Tête avec les yeux un peu plus large que le prothorax chez ♂; prothorax assez court et pas très large, un peu étranglé au milieu, un peu rétréci et subarqué en avant, sillonné au milieu; élytres peu plus larges que le prothorax, longs, subparallèles ♂, ou un peu élargis vers le milieu ♀; pattes grêles, ongles des tarses bifides. Long. : 7–8 millimètres.

Moupin.

Peut se placer près de *P. marmoratus* Brg. dont il se distingue, à première vue, par la forme du prothorax et les élytres non marbrés.

Je sépare, sous le nom de var. *latithorax*, un exemplaire caractérisé par son prothorax bien plus large, à peine arqué en avant.

Podabrus bicoloricornis nov. sp.

Elongatus, nitidus, sparse piceo pubescens, flavus, antennis pro majore parte, pectore medio, abdomine ad basim, tibiis apice tarsisque nigris.

Allongé, brillant, éparsément pubescent de gris, avant-corps peu ponctué, flave avec les membres et le dessous du corps en partie noirs. Tête avec les yeux bien plus large que le prothorax, un peu rétrécie en arrière;

[1] Cette espèce figure aussi dans ma collection.

antennes assez grêles, à 2e article pas très court mais bien moins long que 3e; prothorax plus long que large, rétréci en avant, sillonné postérieurement au milieu; élytres un peu plus larges que le prothorax, longs, subparallèles, médiocrement ponctués; pattes grêles, ongles bifides. Long. : 10 millimètres.

Moupin.

Très voisin du précédent, en diffère par le prothorax plus allongé, presque droit sur les côtés, la tête brillante, le sommet des tibias et les tarses noirs.

Podabrinus testaceilabris nov. sp.

Angustatus, nitidus, griseo pubescens, testaceus, capite pro majore parte, thorace, scutello elytrisque cyaneo viridibus, metallicis, antennis nigris, ad basim testaceis.

Étroit, brillant, orné d'une pubescence grise en partie soulevée, testacé, avec tout le dessus du corps, sauf le devant de la tête, d'un bleu métallique un peu teinté de verdâtre; antennes noires à base testacée, à 3e article court, bien moins long que 3e et 4e assez grêle; tête assez longue, yeux gros et saillants; prothorax long et étroit, rétréci en avant, sillonné au milieu, bigibbeux sur le disque; élytres un peu plus larges que le prothorax, longs, subparallèles; ongles simples. Long. : 7 millimètres.

Moupin.

Diffère de *P. ædemeroides* Frm. par le dessus du corps de coloration uniforme, la poitrine testacée, le 2e article des antennes court, etc.

Anolisus Davidi nov. sp.

Angustatus, subnitidus, griseo pubescens, capite opaco, late niger, capite infra et antice, coxis trochanteribusque pro parte flavis.

Étroit, peu brillant la tête étant opaque, pubescent de gris, noir, avec la tête en partie, les bords antérieur et postérieur du prothorax, puis les épaules teintées de roussâtre, tête en dessous et en avant, hanches et trochanters en partie flaves. Tête avec les yeux un peu plus large que le prothorax, densément et ruguleusement ponctuée; antennes assez grêles, piteuses, foncées, à 2e article assez long, plus court que 3e; prothorax plus long que large, presque droit et subsinué sur les côtés, sillonné u milieu; élytres bien plus larges que le prothorax, longs, subparallèles, ruguleusement ponctués, à peine costulés; pattes grêles, ongles à peine dentés à la basé. Long. : 7 millimètres.

Moupin.

Sans doute voisin de *A. ocularis* Chp. en diffère (en description) par le prothorax plus foncé, les pattes noires, le prothorax un peu brillant.

Ichthyurus 6-maculatus nov. sp.

♂. *Elongatus, parum nitidus, niger, capite supra, articulis primis antennarum pro parte, femoribus plus minusve, abdomine pro parte, scutello thoraceque flavis aut testaceis, illo minute nigro 6 (4, 2) maculato, elytris subopacis, nigris, ad humeros breve rufo notatis; pedibus anticis et posticis gracilibus, femoribus intermediis valde dilatatis, subdentatis, tibiis robustis; abdomine pro parte nigro, pro parte rufo-testaceo, segmento ultimo nigro, elongato, longe furcato.* Long. : 12 millimètres.

Tonkin : Hoa Binh.

Voisin de *I. maculicollis* Gestro, en diffère, à première vue, par les élytres plus larges, presque tout noirs.

Ichthyurus notatipennis nov. sp.

♀. *Elongatus, parum nitidus, supra aurantiacus et nigro notatus, infra corpore pro parte nigro, pro parte testaceo, antennis nigris, ad basim infra testaceis, pedibus nigris, femoribus ad basim testaceis; capite aurantiaco, postice nigro, medio reducte nigro notato; thorace aurantiaco, medio nigro sinuate fasciato; elytris aurantiacis, externe post humeros late nigro notatis, postice lateraliter nigro marginatis; abdomine nigro, testaceo marginato, segmento ultimo nigro, valido, late inciso.* Long. : 12 millimètres.

Java : Soekaboemi.

Peut se placer près de *I. maculipes* Gestro, en diffère (ex description) par la macule noire des élytres, le dernier segment abdominal tout noir et robuste, les tibias entièrement foncés.

Tenerus atritarsis nov. sp.

Elongatus, nitidus, griseo et fusco pubescens, minute, in elytris densiore, punctatus, rufus, capite postice, antennis, pectore lateraliter, tibiis apice tarsisque nigris; elytris elongatis, incostatis, nigris, signaturis testaceis ornatis: lineis duabus, una externa, altera suturalis paulo dilatata, his ad apicem non prolongatis et fascia transversa postmediana parum distincta. Long. : 11 millimètres.

Acquis comme originaire du Brésil, mais provenance évidemment fausse.

A placer près de *T. binotatus* Chevr., en diffère, en outre de la coloration très particulière des élytres, par le prothorax plus égal, les élytres plus allongés, les pattes presque entièrement testacées.

Pseudeumolpus elongatus nov. sp.

Elongatus, subparallelus, nitidus, glaber, niger, supra viridi-acnescens, tibiis rufis; capite robusto, antice sat fortiter sparseque punctato, postice minute et parum punctato; antennis brevibus, articulis quinque ultimis dilatatis; thorace breve et lato; lateraliter subsinuato, diverse et sparse punctato; elytris thorace paulo latioribus, postice attenuatis, striato-punctatis, intervallis convexis et paulo punctatis, 4-6 et 8 reductis; pedibus brevibus, tibiis paulo curvatis, femoribus anticis fortiter dentatis. Long. : 8 millimètres.

Tonkin : Hoa Binh (ex. R. P. de Cooman).

Voisin de *P. impressicollis* Pic, plus étroit et plus allongé, prothorax moins robuste, structure élytrale particulière avec les intervalles 4, 5, 6 et 8 réduits et finissant un peu après le milieu des élytres.

Hemicera hanoiensis nov. sp.

Angustata, nitida, glabra, nigra, elytris purpureis et externe viridibus, viridi striatis. Capite thoraceque minute et sparse punctatis, illo parum lato, antice attenuato, lateraliter fere recto et paulo marginato, angulis anticis paulo prominulis, rotundatis; elytris thorace paulo latioribus, minute striato-punctatis, striis viridi metallicis, intervallis sat latis, depressis, purpureis, externis exceptis; pedibus brevibus. Long. : 6 millimètres.

Tonkin : Hanoi.

Voisin de *H. annamensis* Pic par sa forme, mais élytres moins longs et de coloration toute autre.

Cephalolia basalis nov. sp.

Oblonga, nitida, testacea, elytris nigris, ad basim reducte testaceis, antennis nigris, articulis 2 primis rufescentibus; capite parum lato; thorace subquadrato, lateraliter recto, angulis anticis paulo prominulis et rotundatis, fortiter et sparse punctato, elytris thorace distincte latioribus sat brevibus, fortiter lineato-punctatis, lateraliter substriatis. Long. : 5 millimètres.

Brésil : Espirito Santo.

Voisin de *C. apicalis* Baly, moins allongé avec les élytres à coloration noire plus étendue et les deux premiers articles des antennes roussâtres.